

DESCRIPTIONS DE TROIS ESPÈCES NOUVELLES  
DE CHRYSOMELINI DE L'ASIE ORIENTALE,

PAR M. S.-H. CHEN.

**Paropsides Bouvieri** sp. nov.

Corps ovale, connexe, médiocrement brillant, d'un jaune rousâtre tirant parfois sur le brun. Pronotum avec une bande longitudinale médiane noire et deux petites taches rondes situées chacune sur l'impression latérale. Élytres marqués chacun de cinq taches : une basilaire, rectangulaire, transversale, comprenant le calus huméral; deux un peu en avant du milieu, transversales, plus ou moins rattachées l'une à l'autre; deux post-médianes, dont l'interne, contiguë à son homologue sur la suture, est réniforme (parfois divisée), et se continue chez quelques exemplaires sur la suture vers l'apex, la tache externe subcarrée, située au même niveau que l'interne, à proximité immédiate du bord latéral.

Tête assez fortement et irrégulièrement pointillée, la ponctuation plus serrée auprès des yeux; épistome séparé du front par une ligne largement arquée de chaque côté, en forme d'accolade; sillon longitudinal indistinct. Antennes dépassant la base du pronotum, 1<sup>er</sup> article renflé et allongé, 3<sup>e</sup> de moitié plus long que le 2<sup>e</sup>, et presque aussi long que le 4<sup>e</sup>, les sept derniers articles élargis légèrement et progressivement vers l'extrémité. Pronotum deux fois et demi aussi large que long, marqué d'une impression latérale; sa ponctuation forte et serrée, entremêlée de points très fins; bord antérieur largement émarginé, côtés convexes, angles antérieurs subarrondis, les postérieurs obtus. Scutellum en triangle curviligne, lisse. Élytres plus larges à la base que le prothorax; fortement ponctués, les points étant partiellement disposés en séries; intervalles marqués de gros points et d'une très fine ponctuation; bourrelets latéraux fortement et confusément ponctués.

Dessous du corps brillant, parsemé de quelques points très fins sur les segments abdominaux. Pattes médiocres, 3<sup>e</sup> article des tarses très large.

Espèce voisine de *P. duodecimpustulata*, subsp. *Melli* Reineck. Elle s'en distingue à la fois par son système de coloration, par sa

forme plus étroite en avant et par la ponctuation des élytres un peu plus forte.

Long. : 10 mm.

Hab. : Tonkin : Hoa Binh (A. de Cooman); région de Chim Hoa et de Tuyen Quan (A. Weiss).

Type au Muséum de Paris. Décrit sur cinq exemplaires.

#### **Phytodecta Lesnei** sp. n.

Oblong-ovalaire, convexe, d'un rouge roux luisant, avec les articles des antennes (sauf les quatre premiers articles qui sont bruns), l'extrémité des mandibules, les palpes maxillaires, les genoux, les tibias et les tarsi noirs.

Tête éparsément pointillée, épistome séparé du front par une ligne anguleuse prolongée en arrière en un sillon médian longitudinal. Antennes dépassant à peine la base du pronotum, 1<sup>er</sup> article renflé, 3<sup>e</sup> de moitié plus long que le 2<sup>e</sup> et à peine plus long que le 4<sup>e</sup>, les articles suivants épaissis progressivement vers l'extrémité. Prothorax deux fois et demi plus large que long, convexe, très déclive en avant, côtés presque droits, rétrécis d'arrière en avant; angles antérieurs saillants, subaigus, les postérieurs presque droits, base légèrement sinuée; côtés parsemés de points forts, peu nombreux, presque lisses sur le bourrelet latéral; ponctuation du disque très fine, écartée. Écusson en triangle curviligne, large, lisse. Élytres semiglobuleux, plus larges à la base que le prothorax; calus huméral distinct; ponctuation disposée suivant 11 lignes régulières, dont les intervalles sont très finement et éparsément pointillés, presque lisses.

Dessous du corps parsemé de points écartés. Pattes robustes; tous les tibias dentés.

Cette espèce, qui habite le Yunnan, est le plus gros *Phytodecta* connu; elle se rapproche du *Ph. semiglobosus* Achard, de Chine, mais s'en distingue facilement par sa taille et sa couleur.

Long : environ 12 mm.

Hab. : Yunnan : Sse Tsong, alt. 2.000 m. (P. Souyris). Don de M. P. Guerry.

Décrit sur un exemplaire de la collection du Muséum de Paris.

#### **Phytodecta coccinella** sp. nov.

Ovale, convexe, brillant. Tête et pronotum d'un rouge acajou avec une bande transversale noire à la base de celui-ci. Bords latéraux et antérieur du pronotum très finement lisérés de noir. Palpes maxillaires et base des antennes flaves, avec la massue de celle-ci noire. Élytres jaune brun, avec une bordure noire à la base, une

macule ovalaire sur le calus huméral et 2 bandes transversales, l'une située un peu en avant du milieu et remontant vers la base sur la suture, l'autre un peu au-dessous du milieu, se continuant sur la suture jusqu'à l'apex. Dessous du corps d'un jaune-brun rougeâtre.

Tête assez fortement et densément pointillée; épistome séparé du front par une ligne anguleuse plus ou moins obsolète. Antennes courtes, atteignant à peine la base du pronotum, 1<sup>er</sup> article renflé, 3<sup>e</sup> un peu plus long que le 2<sup>e</sup>, les six derniers élargis et comprimés. Prothorax transversal, trois fois plus large que long, rétréci en avant, ses côtés droits; angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits; ponctuation assez forte, dense, plus ou moins fine sur le disque. Écusson en triangle curviligne, large, lisse. Élytres ovalaires presque aussi larges à la base que le pronotum; calus huméral peu saillant; les séries de points disposées suivant 11 lignes régulières, la première, juxtascutellaire, très courte, la 11<sup>e</sup> ou dernière située dans une ligne enfoncée, contre le rebord marginal; intervalles marqués de points épars, très fins, presque lisses.

Dessous du corps assez fortement et éparsément pointillé. Pattes assez robustes; tous les tibias dentés; tarses intermédiaires très courts.

Cette forme rappelle beaucoup les Coccinelles par son facies. Elle se distingue facilement des autres espèces du groupe.

Long. : environ 5 mm.

Hab. : Tonkin central, environ de Tuyen Quan (A. Weiss).

Décrit sur un exemplaire de la collection du Muséum de Paris.